



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Rep. N° 31/2014

Bollettino settimanale sul monitoraggio vulcanico, geochimico, delle deformazioni del suolo e sismico del vulcano Stromboli del 29/07/2014



Stato di funzionamento delle reti

Rete di monitoraggio	Numero di Stazioni	Numero di stazioni non funzionanti	Note
Deformazioni (clinometrica)	3	1	La stazione del COA è stata dismessa il 12/03/2013, perchè il foro si è dimostrato non idoneo per misure clinometriche di precisione.
Deformazioni (GPS)	5	1	La stazione SCPS non è funzionante. Per problemi ai sistemi informatici al COA, dal giugno 2013 non sono disponibili i dati.
Deformazioni (THEODOROS)	1 + 20 riflettori	6 riflettori	Il sistema non visualizza i dati dal 30 settembre. Da fine novembre 2012 il computer di controllo e gestione del sistema è guasto.
Sismologia	13	5	---
Rapporto CO2/SO2 nel plume	2	-	
Flussi SO2 Rete-FLAMES	4	-	
Flusso CO2 dal suolo	1	-	
Telecamera visibile	2		
Telecamera termica	4	1	Vancori non funzionante per problemi di trasmissione dati

Sezione 1 - Vulcanologia

L'analisi delle immagini registrate dalle telecamere poste sul Pizzo sopra la Fossa, a quota 400 e 190 m s.l.m. ha consentito di caratterizzare l'attività eruttiva dello Stromboli.

Nel periodo esaminato l'attività esplosiva è stata prodotta, in prevalenza, da 2 (due) bocche eruttive localizzate nell'area craterica Nord e da 3 (tre) bocche eruttive localizzate nell'area craterica Sud. Tutte le bocche sono poste all'interno della depressione che occupa la terrazza craterica (Fig. 1.1).

Il giorno 23 luglio a causa delle avverse condizioni meteo la visibilità della terrazza craterica è stata insufficiente per consentire una completa descrizione dell'attività eruttiva.




Fig. 1.1 La terrazza craterica vista dalla telecamera termica posta sul Pizzo sopra la Fossa, con i settori in cui è divisa la terrazza craterica (AREA N, AREA S). Le sigle e le frecce indicano i nomi e le ubicazioni delle bocche attive.

La bocca N1 che è situata nell'area Nord e presenta due punti di emissione, ha prodotto esplosioni d'intensità variabile da bassa (minore di 80 m di altezza) a media (talvolta i proiettili hanno raggiunto i 150 m di altezza) con emissione di materiale grossolano (lapilli e bombe). La bocca N2 ha mostrato una sporadica attività esplosiva d'intensità bassa (minore di 80 m di altezza), con emissione di materiale grossolano. La frequenza media delle esplosioni dell'area N è stata variabile tra 4 e 13 eventi/h.

La bocca S1 ha mostrato una continua e debole attività di spattering interrotta da qualche esplosione di bassa intensità di materiale grossolano. La bocca S2 non ha mostrato attività esplosiva significativa. La bocca S3, posta sul cono prospiciente la Sciara del Fuoco, ha mostrato a tratti una intensa attività di spattering interrotta da qualche esplosione di bassa intensità, con emissione di materiale grossolano. La bocca S4, con due punti di emissione attivi anche contemporaneamente, ha mostrato attività esplosiva di intensità medio-bassa (minore di 120 m di altezza) producendo materiale fine talvolta frammisto a grossolano. La frequenza delle esplosioni dall'area S è stata variabile tra 8 e 12 eventi/h.

Nel grafico sottostante (Fig. 1.2) è visualizzata la frequenza oraria media giornaliera degli eventi esplosivi ripresi dalle telecamere di sorveglianza dal 1 gennaio 2014. La depressione craterica è stata suddivisa in aree sede di bocche eruttive attive (vedi Fig. 1.1), pertanto le bocche poste nella porzione settentrionale costituiscono l'area N e le bocche poste nella porzione meridionale costituiscono l'area S. Il valore Totale è la somma della frequenza oraria media giornaliera di tutti gli eventi esplosivi prodotti dalle bocche attive.




Fig. 1.2 Andamento della frequenza oraria media giornaliera degli eventi esplosivi dal 1 gennaio 2014, in grigio il periodo esaminato.

Sezione 2 - Geochimica

Flusso di CO₂ dai suoli - Il valore medio settimanale misurato alla stazione di misura del flusso di CO₂ dal suolo STR02 posta al Pizzo sopra La Fossa è in linea con le misure precedenti e pari a circa 6600 g m⁻² d⁻¹. Giorno 26 si è registrato un valore di picco più alto relativamente alla media settimanale (CO₂>7600 g⁻² d⁻¹).




Fig. 2.1 Andamento temporale del flusso di CO₂ dai suoli: a) ultimo mese; b) ultimo anno

Chimica del plume - Il valore medio settimanale del rapporto CO₂/SO₂ misurato dalle stazioni di monitoraggio Fortini e Pizzo è pari a 6.3, in linea con i valori dell'ultimo periodo. Durante il periodo in osservazione le misure del plume sono state acquisite con minore frequenza a causa della non favorevole direzione dei venti principali.




Fig. 2.2 Andamento temporale del rapporto CO₂/SO₂ nel plume: ultimi tre mesi (a), ultimo anno (b).

Flussi di SO₂ - Il valore medio settimanale del flusso di SO₂ emesso dal plume, misurato dalla rete FLAME, è di circa 150 t/g, in linea alle precedenti misure. Giorno 26 cm le misure infragiornaliere hanno indicato flussi sino a ~500 t/g.




Fig. 2.3 Andamento temporale del flusso di SO₂: a) ultimo mese; b) ultimo anno

Sezione 3 - Deformazioni del suolo

Rete clinometrica.

Le stazioni di Labronzo e Timpone del Fuoco acquisiscono con frequenza di un dato al minuto lungo due componenti tra loro ortogonali.

Per un guasto ai sistemi informatici di trasmissione, i dati di Punta Labronzo non sono disponibili alla data odierna.

L'analisi preliminare dei segnali dell'ultima settimana della stazione di Timpone del Fuoco non ha evidenziato variazioni significative.




Fig. 3.1 Variazione dell'inclinazione del suolo alla stazione clinometrica di TDF. Sono riportate le componenti N185°E e N275°le di TDF nel lungo e nel breve periodo.

Misure GPS

La Rete GPS permanente acquisisce dati a frequenza di 1Hz su 4 delle 5 stazioni di misura. L'analisi delle serie temporali fornite dall'elaborazione giornaliera dei dati delle stazioni della rete, ed in particolare della baseline SPLB-STDF, disponibile fino al 22 luglio a causa di un guasto ai sistemi informatici del COA, non mostra variazioni significative al di fuori dell'incertezza della misura.





Fig. 3.2 Variazione della Distanza Reale (Slope Distance) tra le stazioni GPS permanenti di Punta Labronzo (SPLB) e Timpone del Fuoco (STDF), nei due intervalli di un anno (in alto) e di un mese circa (in basso).

Sistema THEODOROS Utilizzando tecniche di geodesia terrestre, il sistema determina la posizione nelle tre componenti (Nord, Est e Quota) di 8 capisaldi installati dentro la Sciara del Fuoco, sulla colata dell'eruzione 2007 (parte distale della colata e delta lavico ai piedi della Sciara). Permangono ancora problemi nell'acquisizione dei dati a causa di guasti all'HW del sistema.

Sezione 4 - Sismologia

Nell'ultima settimana sono stati registrati 37 segnali sismici associabili ad eventi franosi, di

piccola entità, lungo la Sciara del Fuoco.




Fig. 4.1 Frequenza giornaliera dei segnali di frana dal 1/1/2010 (sinistra) e nell' ultima settimana (destra).

Nell'ultima settimana l'ampiezza del tremore vulcanico ha avuto generalmente valori compresi tra medio-bassi e medio-alti. In particolare l'ampiezza del tremore ha mostrato un lieve trend in aumento a partire dal giorno 28/07 raggiungendo valori medio-alti che tuttora persistono.




Fig. 4.2 Media giornaliera dell'ampiezza del tremore alla stazione STR1 dal 1/01/2010 (sinistra) ed ampiezza del tremore nell'ultima settimana (destra).

Nell'ultima settimana la frequenza di occorrenza dei VLP ha avuto valori compresi tra 11 e 17 eventi/ora.




Fig. 4.3 Frequenza di accadimento degli eventi VLP dal 1/1/2010 (sinistra) e nell'ultima settimana (destra).

Nell'ultima settimana l'ampiezza dei VLP si è mantenuta generalmente su valori bassi, con qualche evento di ampiezza medio-bassa.

Nell'ultima settimana l'ampiezza degli explosion-quakes ha avuto generalmente valori bassi, con qualche evento di ampiezza medio-bassa.

La localizzazione degli eventi VLP non evidenzia particolari variazioni e mostra la presenza di una sorgente stabile nell'intervallo 400-550 metri s.l.m. Gli ipocentri risultano ben clusterizzati.

La polarizzazione degli eventi VLP conferma la stabilità della sorgente.




Fig. 4.4 Ampiezza dei VLP alla stazione STR1 dal 1/1/2010 (sinistra) e nell'ultima settimana (destra).

Sintesi

In questo periodo è stata osservata una normale attività esplosiva di tipo stromboliano accompagnata da una attività di spattering. È da sottolineare che, nei giorni 21 e 22 luglio, è cambiata la localizzazione dell'attività esplosiva sommitale: mentre sin dagli inizi del mese di luglio erano state attive prevalentemente le bocche dell'area craterica N, a partire dal 21-22 luglio l'attività prevalente avviene dalle bocche situate nell'area craterica S.

La frequenza delle esplosioni ha oscillato su valori medi (13-16 eventi/h. L'intensità delle esplosioni è stata in prevalenza media all'area craterica Nord e medio-bassa all'area craterica Sud.

I parametri geochimici in funzione non mostrano variazioni di particolare rilievo.

Il livello dell'ampiezza del tremore vulcanico persiste su valori compresi tra medio-bassi e medio-alti. Inoltre a partire dal giorno 28/07 si è osservato un lieve trend in aumento. I restanti parametri sismologici monitorati non mostrano variazioni significative.

DISCLAIMER

L'INGV, in ottemperanza a quanto disposto dall'Art.2 del D.L. 381/1999, svolge funzioni di sorveglianza sismica e vulcanica del territorio nazionale, provvedendo alla organizzazione della rete sismica nazionale integrata e al coordinamento delle reti sismiche regionali e locali in regime di convenzione con il Dipartimento della Protezione Civile.

L'INGV concorre, nei limiti delle proprie competenze inerenti la valutazione della Pericolosità sismica e vulcanica nel territorio nazionale e secondo le modalità concordate dall'Accordo di programma decennale stipulato tra lo stesso INGV e il DPC in data 2 febbraio 2012 (Prot. INGV

2052 del 27/2/2012), alle attività previste nell'ambito del Sistema Nazionale di Protezione Civile.

In particolare, questo documento, redatto in conformità all'Allegato A del suddetto Accordo Quadro, ha la finalità di informare il Dipartimento della Protezione Civile circa le osservazioni e i dati acquisiti dalle Reti di monitoraggio gestite dall'INGV su fenomeni naturali di interesse per lo stesso Dipartimento.

L'INGV fornisce informazioni scientifiche utilizzando le migliori conoscenze scientifiche disponibili; tuttavia, in conseguenza della complessità dei fenomeni naturali in oggetto, nulla può essere imputato all'INGV circa l'eventuale incompletezza ed incertezza dei dati riportati e circa accadimenti futuri che differiscano da eventuali affermazioni a carattere previsionale presenti in questo documento. Tali affermazioni, infatti, sono per loro natura affette da intrinseca incertezza.

L'INGV non è responsabile dell'utilizzo, anche parziale, dei contenuti di questo documento da parte di terzi, e/o delle decisioni assunte dal Dipartimento della Protezione Civile, dagli organi di consulenza dello stesso Dipartimento, da altri Centri di Competenza, dai membri del Sistema Nazionale di Protezione Civile o da altre autorità preposte alla tutela del territorio e della popolazione, sulla base delle informazioni contenute in questo documento. L'INGV non è altresì responsabile di eventuali danni recati a terzi derivanti dalle stesse decisioni.

La proprietà dei dati contenuti in questo documento è dell'INGV. La diffusione anche parziale dei contenuti è consentita solo per fini di protezione civile ed in conformità a quanto specificatamente previsto dall'Accordo Quadro sopra citato tra INGV e Dipartimento della Protezione Civile.